

Par monts et par vaux

La Petite Loire, en période d'été

Si les fossés des prairies basses de Blaison ne conservent que peu d'humidité (les quelques bruines automnales n'ont guère apporté d'eau), le fond des boires, en particulier le lit de la Petite Loire recèle encore, malgré un été bien sec, plusieurs mares en eau, ou encore des fonds qui sont loin d'être bien secs et sur lesquels toute une flore originale peut prospérer : nombre de floraisons peuvent ainsi se poursuivre au cours du mois d'octobre.

C'est là le royaume des bidents, ASTÉRACÉES qui peuvent atteindre un mètre de hauteur.



Ils ne peuvent passer inaperçus, leurs petits fruits allongés, terminés par deux sortes de dents munies de minuscules crochets (d'où le nom de ces plantes) ne manqueront pas d'adhérer aux vêtements de l'observateur de passage. L'espèce la plus courante est le Bident trifolié, *Bidens tripartita*, la plus grande étant *Bidens fondosa* dont les fruits sont de couleur noire. Cette dernière a été importée d'Amérique et est parfois appelée, à tort, chanvre d'eau.

Avec une seule tige surmontée d'un épi de fleurs d'un rose presque blanc, le Poivre-d'eau, *Polygonum hydropiper*, fait partie des renouées (ce groupe de plantes possède des renflements, ou nœuds, là où s'insèrent les feuilles*).



← Poivre-d'eau



Gnaphale des marais →

Bien plus petit, le Gnaphale des marais, *Filaginella uliginosa*, est couvert d'un duvet blanc. Son nom français provient du grec *gnaphlon* signifiant laine.

J.-C. S.

* Attention ! ce n'est pas spécifique aux seules renouées ; une famille très différente, celle de l'œillet possède cette caractéristique.

